

## Specialistskrivning i Barn- och ungdomsmedicin 2016

Markera det eller de alternativ som du anser överensstämmer. Varje rätt svar ger 1 poäng, medan felaktiga svar ger ½ poängs avdrag. Inga poäng eller poängavdrag ges för uteblivet/uteblivna svar.

**1. Vilken sjukdom tyder dessa labparametrar på?  
Lågt Ca, högt PTH, lågt Fosfat och högt ALP**

- rakit
- Fanconis syndrom
- x-bunden hypofasfatemi
- vitamin D intoxikation

**2. Vad är sant gällande glomerulonefrit?**

- C3 och C4 är sänkta vid postinfektiös glomerulonefrit
- ANCA är positiv vid IgA nefrit
- C3 och C4 är normala vid Henoch-Schönlein nefrit
- C3 och C4 är normala vid SLE

**3. Ett barn med sickle cell anemi ligger inlagd på avdelningen pga feber och ont i kroppen. Barnet blir plötsligt försämrad med ökat bukomfång, blir blek, takycard och får takypné. Vad kan man misstänka har tillstött?**

- peritonit
- sekvestrering av blod i mjälten
- akut bröstsyndrom
- gallstensanfall

**4. När tar man ett så kallat TPMT-prov?**

- inför metotrexatbehandling
- inför behandling med biologiska läkemedel
- inför azatioprinbehandling
- innan man ger cortison vid malignitet

**5. Vilket/vilka antibiotika är förstahandsval vid neutropen feber?**

- Vancocin
- Nebcina
- Meronem/Tazocin
- Fortum

**6. Vad minskar risken för att ett barn utvecklar astma?**

- att modern undviker fisk, mjölk, nötter och ägg under graviditeten
- att barnet inte vaccineras
- att växa upp utan husdjur
- att modern låter bli att röka under graviditeten

**7. I vilket nordiskt land är incidensen för typ 1 diabetes högst?**

- Sverige
- Danmark
- Finland
- Norge

**8. Vilket av följande analgetika bör ej användas vid inflammatorisk tarmsjukdom?**

- paracetamol
- morfin
- citodon
- NSAID

**9. Vid SIADH är S-osmolaliteten och U-Natrium...**

- båda låga
- båda höga
- båda normala
- S-osmolaliteten låg och U-Natrium hög

**10. Vilken del av tarmen drabbas ofta av inflammation vid Crohns sjukdom?**

- colon transversum
- colon sigmoideum
- ileocekala delen
- duodenum

**11. Vilket hjärtfel tyder dessa symtom på hos ett 2 månader gammalt barn: takycardi, takypné och hepatosplenomegali?**

- ASD
- VSD
- coarctatio aortae
- anomalt mynnande lungvener

**12. Samma symtom som ovan, men hos ett 5 dygn gammalt barn, tyder på...**

- coarctatio aortae
- VSD
- ASD
- mitralisstenos

**13. Vilket prov kan vara av värde att ta vid en misstänkt anafylaxi?**

- IgE total
- S-Ca
- tryptas
- histamin

**14. Vilket/vilka av följande är inte indikation för dialys vid akut njursvikt?**

- svår hypertoni
- svår hyponatremi
- svår hyperkalemi
- anuri

**15. Vad är inte en riskfaktor för early onset sepsis hos nyfödda?**

- tidig vattenavgång
- feber hos mor i samband med partus
- förlossning efter 42 veckor
- syskon som haft neonatal GBS sepsis

**16. Vilket är vanligast agens för neonatal sepsis vid debut inom 72 h?**

- KNS
- E. coli
- GBS
- S. aureus

**17. Vilka laboratoriefynd är typiska för tumörlyssyndrom?**

- hyperuricemi, hyperkalemi, hyperkalcemi och högt kreatinin
- hyperuricemi, hypokalcemi, hyperfosfatemi och högt kreatinin
- hypokalemi, hypofosfatemi, hyperkalcemi och normalt kreatinin
- acidosis, hyperuricemi, hyperkalcemi och högt kreatinin

**18. Vilken epilepsimedicin skall man helst undvika till barn under 2 år?**

- Lamictal
- Fenemal
- Valproat
- Keppra

**19. Vilken av dessa komplikationer är ej associerade till nefrotiskt syndrom?**

- hyperkolesterolemi
- trombos
- pneumokockinfektion
- njursten

**20. Om du är allergisk mot cashewnöt tål du oftast vanligen inte heller...**

- jordnöt
- pistagenöt
- hasselnöt
- valnöt

**21. Vad är steg 1 i behandlingsarsenalen vid Kawasakis sjukdom?**

- högdoscortison
- TNF-blockad
- ASA
- IVIG

**22. Vilken är den vanligaste periodiska febern hos barn?**

- FMF
- PFAPA
- hyper IgD-syndrom
- TRAPS

**23. Vilken röntgenundersökning är bäst på att diagnostisera en osteomyelit?**

- slätröntgen
- scintigrafi
- MR
- CT