

NAMN PÅ DIG SOM GÖR SKRIVNINGEN:

2013 års specialistskrivning i Pediatrik – till dig som är kontaktperson för skrivningen

Skrivningsdatum: 2013-10-25.

Skrivningen delas ut kl 13 fredagen den 25 oktober och samlas in senast kl 15. Den som skriver bör sitta avskilt och får inte ha kontakt med andra personer under skrivningstiden eller använda några hjälpmedel.

Du får inte kopiera upp extra exemplar av skrivningen. Vi skickar enbart ut skrivningen till de som anmält sig och betalat avgiften. Ifyllt skrivning skickas av klinikens kontaktperson till:

Camilla Frisö
Barnkliniken
Universitetssjukhuset
70185 Örebro

Vi vill ha skrivningen tillhanda senast tisdag 29 oktober.

Instruktioner till dig som gör skrivningen.

Skriv ditt namn överst på varje sida.

2013 års skrivning består av 192 påståenden.

Du ska för varje påstående svara Ja (sant) eller Nej (falskt). Du har två timmar på dig att göra skrivningen. Du får inte använda några hjälpmedel.

Skrivningsresultatet skickas sedan enbart till dig. Det är upp till dig om du informerar din handledare/studierektor/klinikchef om skrivningsresultatet. Vi från Barnläkarföreningen rekommenderar att du informerar någon av dessa personer men det är inget krav.

Gränsen för godkänt meddelas samtidigt med ditt skrivningsresultat. Det finns två nivåer: *godkänt* eller *icke-godkänt*. Skrivningsresultatet kan inte överklagas, och vi lämnar inte ut svar på enskilda frågor.

Du kan förvänta dig ett resultat per email senast 15 november.

När du skriver denna skrivning förbinder du dig att inte berätta för andra vilka påståenden som förekommer i skrivningen. Det kan tänkas att vi återanvänder påståenden/frågor i framtiden. När du är färdig med skrivningen lämnar du den till klinikens kontaktperson för skrivningen. Han/Hon skickar sedan in skrivningen till oss.

Lycka till!

Det här kommer att gå bra!

Skrivningsansvarig Jonas Ludvigsson
Barnläkare i Örebro
Professor, Karolinska Institutet

NAMN PÅ DIG SOM GÖR SKRIVNINGEN:

Testnummer	Ja/Sant	Nej/Falskt	
0,31		1	Acanthosis nigricans hos feta barn beror på höga nivåer av glukagon
1,17	1		Vid apparbedömning ges barn med perifer cyanos 1 poäng för färg
1,89		1	Williams syndrom är starkt associerat till fetma
1,90	1		Positiv ANA vid juvenil idiopatisk artrit är särskilt vanlig hos unga flickor
2,01		1	Neuroblastom kallas också ofta för Wilms tumör
3,64	1		Vid pertussis-infektion ses ofta höga lymfocytantal
4,02	1		Adoptivbarn är en riskgrupp för tidig pubertet
4,10		1	Gynekomasti hos överviktiga pojkar med fetma beror på höga cortisolhalter
4,61		1	IgG-antikroppar från mor till foster förs främst över under andra trimestern
4,63		1	Under pågående utredning för reumatisk sjukdom bör man avstå från behandling
4,67		1	Barn med neutrofila under 1.0 har en svår neutropeni
5,10		1	Patienter med alfa-1-antitrypsin-brst har ofta svår klåda
6,00	1		Galaktosemi är en kontraindikation till flera förstoppningmediciner baserade på disackarider
7,69		1	Barn med pneumoni och saturation under 95% bör ges extra syrgas
7,77	1		Gastroesofageal reflux kan vara en diff-diagnos till epilepsi hos små barn
7,98		1	Gränsen för alltför tidig pubertetsstart går vid 11 års ålder hos flickor
9,61	1		Galaktosemi debuterar ofta med kräkningar och diarré
10,03		1	Neuroborrelios hos en 4åring behandlar du med doxycyklin
10,80	1		1-2 påsar movicol junior per dag är en vanlig underhållsdos mot förstoppning hos ett barn i lågstadieåldern
14,26		1	Otit hos ett icke-allmänpåverkat barn bör behandlas i 10 dagar
15,75		1	Komplexa epilepsi-anfall innebär att epilepsin inte svarar på diazepam/midazolam-behandling
15,99		1	Uppemot 1% av alla nyfödda har SCID, severe combined immunodeficiency
16,63	1		Leukemi kan ge leverförstoring
17,62	1		Nattskräck - en diffdiagnos till epilepsi - uppkommer i första sömncykeln

NAMN PÅ DIG SOM GÖR SKRIVNINGEN:

Testnummer	Ja/Sant	Nej/Falskt	
18,03	1		Barn med spina bifida löper en ökad risk för osteomyelit
20,37	1		Var 20e 7-åring lider av fetma i Sverige
21,12		1	Defekografi innebär att man mäter ampullens storlek med en tryckmätare
21,27	1		Metakromatisk leukodystrofi är en sfingolipidos
22,24		1	Överlevnaden vid neuroblastom är ca 85%
22,51		1	Flickor med Turners syndrom löper en ökad risk för supravulvulär pulmonalisstenos
23,19		1	Småbarn har ofta högre IgA-nivåer än äldre barn
24,25		1	Skälet till att osteomyelit ofta uppkommer i närheten av metafysen är det snabba blodflödet i barns tillväxtzon
25,50		1	Ungefär vart femte barn med infantil spasm lider av utvecklingsförsening
25,68	1		Methotrexat har bättre effekt på reumatism när det ges subkutant snarare än per oralt
26,21		1	Hos barn med ledbesvär och blåroda ögonlock bör man misstänka psoriasis-atrit
26,86	1		Telarche har ofta god prognos
28,20	1		Bakteriell pneumoni hos ett icke-allmänpåverkat barn bör antibiotikabehandlas i 7 dagar
29,63		1	Juvenil idiopatisk artrit (JIA) definieras som minst 3 veckors ledinflammation hos ett barn under 16 år där annan orsak till ledbesvär uteslutits
30,93	1		Galopptrytm är typiskt för hjärtsvikt hos barn
31,24	1		
31,98	1		Pre-pubertal typ 1 diabetes kräver ofta 0.5-1 E insulin/kg och dygn
32,06	1		Från det att barnet väger 10 kg kan du ge 10 mg rektalt diazepam för att häva en feberkramp
32,57	1		Pågående svårare infektion är en kontraindikation till TNF-alfa-hämmar-behandling
33,23	1		Underhållsbehandling till nyfödda med kramp är i första hand fenemal
33,87	1		Viktnedgång i samband med diabetesdebut beror ofta på vätskeförlust
33,90		1	Barn med fenylyketonuri kan inte bryta ned tyrosin
37,31	1		Thyroidea-sjukdom och celiaki är överrepresenterade hos barn med Down syndrom
37,93	1		Vid beta-oxidationsdefekter kan patienten inte bryta ned vissa fettsyror
39,02	1		Hirschsprungs sjukdom sitter framförallt i rektum och sigmoideum
42,34		1	Vid misstanke på Bechterews sjukdom bör du kontrollera HLA-DQ2

NAMN PÅ DIG SOM GÖR SKRIVNINGEN:

Testnummer	Ja/Sant	Nej/Falskt	
43,33		1	Vart fjärde barn med feberkramp utvecklar på sikt epilepsi
43,55		1	Kussmaul-andning vid diabetes beror på lågt Kalium
43,77	1		Metabola sjukdomar försämras ofta vid infektion eller fasta
44,65		1	Kramp hos spädbarn visar sig ofta med takykardi
45,67		1	Förkortningen MODY står för Microscopic Oesophagus-related Dysphagia of the Young
46,06		1	Patienter med biliär atresi har ofta samtidig analatresi
47,05		1	Typ 1 diabetes förekommer hos ungefär 2% av alla barn
47,40		1	Todds pares innebär att en epilepsi-patient får svårt att kissa efter ep-anfallet
48,35		1	Ca 1% av alla barn har en sjukdom av typen inborn error of metabolism
48,95	1		100 mikrogram x 2 är en rimlig underhållsdos flutide diskus till en 7-åring med astma
48,96		1	Osteomyelit drabbar vanligen fingrar och tår
49,60		1	Neuroblastom debuterar oftast i tonåren
49,69	1		Ett barn som fortfarande har astma-symptom trots 400 microgram pulmicort per dag, bör ges montelukast
50,22	1		Barn med neutropeni får ofta infektioner i hud och lunga
50,23		1	SLE går ofta med trombocytos
51,66	1		Patienter med tidigare PC-allergi och då anafylaxi kan ges erythromycin vid en ny bakteriell pneumoni
53,26		1	Wiscott-Aldrich syndrom karakteriseras bland annat av trombocytos
55,82		1	IgA-brist förekommer hos 1 av 100 människor
57,33	1		Vanliga symptom vid neuroblastom är feber, viktnedgång, och gnällighet
57,97		1	Om inte methotrexat har haft effekt på ledinflammation inom 2 veckor är det osannolikt att medicinen har effekt
57,98		1	anti-CCP är oftast förhöjd hos barn med juvenil idiopatisk artrit
60,20		1	Hos spädbarn med ikterus under andra levnadsveckan bör du i första hand misstänka leversjukdom
61,76		1	Lung-empyem orsakas ofta av mycoplasma
62,30		1	Barn med Downs syndrom löper ökad risk för ALL
62,83	1		IgA-brist är associerat till en ökad risk för autoimmunitet

NAMN PÅ DIG SOM GÖR SKRIVNINGEN:

Testnummer	Ja/Sant	Nej/Falskt	
63,94	1		Mykoplasma kan ge erythema multiforme
64,37		1	Kawasaki-diagnosen kan först ställas dag 2, hos barn med konjunktivit, lymfadenit, rodnad munslemhinna, svullna rodnade hand- och fotsulor
64,71		1	Till ett barn med insulinpump och svår ketoacidosis så bör du ordinera en extra måltidsdos från pumpen
65,15		1	Är det normalt för en 2-åring att ha ett total-LPK-värde på 15?
65,51		1	Ett 5 dagar gammalt fullgånget barn vars mor får vattkoppor bör omedelbart ges immunglobulin
66,16		1	Kvantiferon-test gör det möjligt att ställa diagnosen sarcoidosis hos barn
66,78		1	ASAT-ALAT är till stor hjälp för att diagnostisera adeno-virus
67,18	1		Ökad ACTH-produktionen vid Cushings sjukdom leder till acne
67,54	1		Fetma kan leda till menstruationsrubbing hos flickor
67,65		1	Hos ett slapt nyfött barn med hjärtfrekvens <60/min påbörjar du genast både maskventilation och thoraxkompressioner.
67,71	1		Leukopeni är en vanlig biverkan vid salazopyrin-behandling
68,29	1		Hypsarytmi på EEG hos ett barn < 1 års ålder talar starkt för infantil spasm
69,01	1		Bröstmjolk innehåller laktos
71,23	1		Vid hemofili A saknas faktor 8
71,80	1		Nära anhöriga som exponerats för meningokockmeningit bör ges PCV-profylax
73,03	1		Kirurgi kan bli aktuell vid icke-responsiv termoporallobs-Epileps
73,57		1	Biliär atresi bör åtgärdas mellan 3-6 års ålder
73,75	1		Det är normalt för småbarn att under vinterhalvåret i genomsnitt ha en luftvägsinfektion var 3e vecka
74,01		1	Det viktigaste livsstils-rådet man bör ge alfa-1-antitrypsin-patienter är att de ska undvika alkohol
74,23	1		Barn med osteomyelit har ofta normalt LPK
74,82		1	Singulair kan ge tillväxtpåverkan
75,31		1	Vaccination mot Hemophilus influenzae typ B har lett till färre otiter i Sverige
76,62	1		Variantlymfocyter är typiska vid mononukleos
76,84	1		Ca 100% av alla barn med Downs syndrom har en utvecklingsförsening
77,77		1	Kawasaki drabbar framförallt barn i tonåren

NAMN PÅ DIG SOM GÖR SKRIVNINGEN:

Testnummer	Ja/Sant	Nej/Falskt	
78,16		1	Barn mellan 2 och 5 år med perforerad otit bör inte antibiotika-behandlas
78,63		1	Vid neonatal återupplivning ventilerar du barnet med 40 andetag per minut
79,62		1	Terapisvikt vid otit definieras som utebliven effekt efter 3 antibiotika-doser
79,91	1		Mykoplasma ger ofta ingen eller en låg LPK-stegring
81,02	1		Hjärtkomplikationer är den största faran vid Kawasakis syndrom
81,25		1	Addison-patienter har vanligen högt Na och lågt K
81,33	1		Hos ett barn med tonsillit, högt CRP men negativ Strep A bör man överväga adenovirus
81,34		1	MCM6-genen testas för att utesluta att ett barn har celiaki
1009.82		1	Pneumonier hos barn i övre tonåren orsakas oftast av pneumokocker
1022.97	1		500-regeln är ett sätt att beräkna mängder kolhydrater (gram) i måltiden som 1 enhet insulin tar hand om
1025.89	1		Vid ketoacidosis hos nydebuterad diabetes ska extra K ⁺ ges när [K] sjunker under 5 eller pat kissar
1033.60	1		För att diagnostisera neuroblastom kontrollerar man nivåerna av katekolamin-metaboliter
1061.71	1		Att barnets föräldrar är släkt ökar risken för metabola sjukdomar
1071.98		1	Vid akut astma hos en 1-åring är 5 mg ventoline i nebulisator en lämplig dos
1078.63	1		Immunoglobuliner är en möjlighet att behandla Kawasakis syndrom
1119.99	1		Hypokalemin vid korrigerad diabetes beror bl.a. på att insulin driver K intracellulär
1136.60		1	Uveit hos barn med juvenil idiopatisk artrit ger ofta svår klåda
116.69		1	Bakteriella pneumonier hos barn under en månads ålder orsakas oftast av pneumokocker
1166.67		1	I u-länder orsakas en stor del av Addison's sjukdom av giardia
1231.71	1		Vid akut trauma eller magtarmblödning bör barn med hemofili ges faktorkoncentrat
1244.75	1		Uppemot hälften av alla barn med Down syndrom har medfött hjärtfel
130.62		1	Typiska symptom vid ketoacidosis är hunger och huvudvärk
1310.81		1	Nyfödda med hemofili A har ofta navelblödningar

NAMN PÅ DIG SOM GÖR SKRIVNINGEN:

Testnummer	Ja/Sant	Nej/Falskt	
1317.73		1	Om en pappa har Hemofili B, så drabbas ca 25% av hans döttrar av Hemofili B
1337.74		1	Fruktosintolerans leder till kompensatorisk hyperglykemi
1337.75	1		BCG är ett levande vaccin
1348.60	1		Både gastroenterit och höga steroiddoser kan ge stegrat p-glukos
1354.85	1		Hyperton NaCl kan vara ett behandlingsalternativ vid akut diabetes-hjärnödem
1355.72	1		Komplementbrist kan leda till glomerulonefrit
1358.67	1		CRP är ofta 70-80 hos barn med influensa
1441.96		1	Rhinovirus är en vanlig orsak till myokardit
1449.85	1		För att säkerställa Downs syndrom kan man använda FISH-teknik
145.82		1	Hos en fyra-åring med laktosintolerans kan diagnosen bekräftas med ett genetiskt test
1464.86	1		Hos spädbarn kan temperatur < 36 grader signalera svår infektion
1492.90		1	Hos ett tidigare friskt barn med nydebuterad facialis pares bör du i första hand utesluta tularemi
1537.71	1		Ökad behåring hos småbarn bör alltid utredas
1555.63		1	Vid empyem ser lung-röntgen ofta ut som en snöstorm
1571.74		1	Redan lätt förhöjda ammoniaknivåer hämmar andningen
1575.66		1	De flesta barn som får tuberkulos i Sverige har bägge sina föräldrar födda i Sverige?
1587.60		1	Mykoplasma är vanligare bland förskolebarn än bland skolbarn
1587.83		1	Förkortningar CAH står för congenital axillary lymph glandula hypertrophy
1593.70	1		4-åringar blir vanligare mer sjuka av en tuberkulos än 14-åringar
1611.71		1	En ettåring med 50 andetag per minut har en förhöjd andningsfrekvens
1625.88	1		Tonåringar med otit bör antibiotika-behandlas
1671.98	1		Porfyri leder ofta till buksmärta
1714.69	1		Metotrexat är en folsyra-antagonist
1734.94		1	Addisons sjukdom kan leda till hyperglykemi
1740.89	1		Infektion med Pneumocystis jirovecchi förekommer främst hos immunsupprimerade patienter
1745.70	1		Hypertrofi av adenoider och tonsiller utgör ett potentiellt luftvägshinder ffa i åldrarna 3-8 år
1777.83	1		Vid ketoacidosis hos nydebuterad diabetes ska insulin-behandling startas 1-2 timmar efter insatt vätskebehandling

NAMN PÅ DIG SOM GÖR SKRIVNINGEN:

Testnummer	Ja/Sant	Nej/Falskt	
178.68		1	IgG-antikroppar från mor till foster skyddar barnet från infektioner under de första 12-14 månaderna efter födelsen
1781.90	1		Till tonårs-tjejer med nydebuterad epilepsi bör man undvika valproat
1793.82		1	Alagilles syndrom är en form av familjär kardiomyopati
1845.88		1	Två streptokock-tonsilliter samma år är indikation för tonsillektomi.
188.95	1		Vattkoppor sprids via luftburen smitta
1918.89		1	Vid 22q11deletions-syndromet saknar patienten thyroidea
1946.87		1	Barn vars vattkoppor har blivit krustbelagda kan fortfarande smitta
1982.97		1	Hyperthyreos leder ofta till förstoppning
1984.83	1		Ventolin (beta-2-stimulerare) har dålig effekt på pseudokrupp
250.87		1	PK är förlängt vid hemofili A
274.84		1	Långverkande beta-2-stimulerare kan vara ett bra behandlingsalternativ till spädbarn med svår RS-virus
276.81		1	Barn med bilateral otit bör utöver per oralt antibiotika även ges terracortril Polymyxin B
296.69		1	Till skillnad från dag-EEG så identifierar sömn-EEG ca 95% av alla epilepsi
302.69		1	Feberkramper är vanliga vid femte sjukan
305.85	1		Det är normalt att palpera ett barns lever 2 tvärfingrar nedom arcus
306.79	1		Den ökade pigmenteringen vid Addisons' sjukdom beror på ökad produktion av melanocyt-stimulerande hormon
314.61		1	Under första levnadsåret svarar barn bättre på polysackarid-baserade vaccin än proteinkonjugerat vaccin
32.74	1		Kromosomuppsättningen vid Turners syndrom är 45X0
34.89	1		Diagnosen autoimmun hepatit ska alltid bekräftas med leverbiopsi
377.83	1		Ett positivt Mantoux-testet talar för tuberkulos
394.86		1	Virusinfektioner är vanliga under spädbarnets första levnadsmånad
431.87	1		De flesta 10-åringar med astma kan hantera en pulverinhalator
449.73		1	Feberkramp är vanligast i spädbarnsåldern
548.73	1		Hos spädbarn ger ofta tredagarsfeber ofta buktande fontanell
565.77	1		Neuroblastom går sällan över mittlinjen
579.75	1		Nefros kan leda till ökad infektionskänslighet

NAMN PÅ DIG SOM GÖR SKRIVNINGEN:

Testnummer	Ja/Sant	Nej/Falskt	
590.83	1		Vid lumbalpunktion hos barn med neuroborrelios finner du vanligen en lymfocytär pleocytos
649.99		1	Halls kriterer är kliniska kriterier för att diagnostisera Sturge-Webers syndrom
720.71		1	Fenylktonuri har en x-bunden nedärvning
723.79		1	Det vanligaste agenset vid osteomyelit är hemophilus influenzae
750.64		1	Barn som är åtta år gamla behöver ofta spacer för att ta sina astma-mediciner
758.92		1	Paracetamol leder till en ökad risk för Reyes syndrom
760.77	1		Hormonet leptin minskar aptiten
830.86	1		Kardiomyopati hos nyfödda leder ofta till hjärtsvikt
864.94		1	Ett barn med fästingbett och hudutslag efter 3 dagar har sannolikt erythema migrans
883.67	1		PiZZ är en typisk fenotyp hos patienter med alfa-1-antitrypsinbrist
896.86	1		ortverkande beta-2-stimulerare har vanligen effekt i 4-6 timmar
934.96	1		Patienter med ett porfyri-skov har ofta rödaktig urin
935.78		1	Blodketoner under 3 mmol/l talar för en välreglerad diabetes
944.78	1		Atrioventrikulär septumdefekt (AVSD) är det vanligaste hjärtfelet vid Down syndrom
955.64		1	Vid feber om 39 grader bör man tre-dubbla dosen fluorinef hos patienter med Addisons sjukdom
979.60	1		Vid apgarbedömning ges barn som gör avvärjningsrörelser/motstånd 2 poäng för retbarhet

Lycka till!