

NAMN PÅ DIG SOM GÖR SKRIVNINGEN: .....

## Specialistskrivning i Pediatrik 2014

### 2014 års specialistskrivning i Pediatrik – till dig som är kontaktperson för skrivningen

Skrivningsdatum: 2014-10-24

Skrivningen delas ut kl 13 fredagen den 24 oktober och samlas in senast kl 15. Den som skriver bör sitta avskilt och får inte ha kontakt med andra personer under skrivningstiden eller använda några hjälpmedel.

Du får inte kopiera upp extra exemplar av skrivningen. Vi skickar enbart ut skrivningen till de som anmält sig och betalat avgiften. Ifylld skrivning skickas av klinikens kontaktperson till:

Camilla Frisö  
Barnkliniken  
Universitetssjukhuset  
70185 Örebro

Vi vill ha skrivningen tillhanda senast tisdag 28 oktober.

### Instruktioner till dig som gör skrivningen.

Skriv ditt namn överst på varje sida.

2014 års skrivning består av 197 påståenden.

Du ska för varje påstående svara Ja (sant) eller Nej (falskt). Du har två timmar på dig att göra skrivningen. Du får inte använda några hjälpmedel.

Skrivningsresultatet skickas sedan enbart till dig. Det är upp till dig om du informerar din handledare/studierektor/klinikchef om skrivningsresultatet. Vi från Barnläkarföreningen rekommenderar att du informerar någon av dessa personer men det är inget krav.

Gränsen för godkänt meddelas samtidigt med ditt skrivningsresultat. Det finns två nivåer: *godkänt* eller *icke-godkänt*. Skrivningsresultatet kan inte överklagas, och vi lämnar inte ut svar på enskilda frågor.

Du kan förvänta dig ett resultat per email senast 17 november.

När du skriver denna skrivning förbinder du dig att inte berätta för andra vilka påståenden som förekommer i skrivningen. Det kan tänkas att vi återanvänder påståenden/frågor i framtiden. När du är färdig med skrivningen lämnar du den till klinikens kontaktperson för skrivningen. Han/Hon skickar sedan in skrivningen till oss.

Lycka till!

Det här kommer att gå bra.

Skrivningsansvarig Jonas Ludvigsson  
Barnläkare i Örebro  
Professor, Karolinska Institutet

**NAMN PÅ DIG SOM GÖR SKRIVNINGEN: .....**

| <b>Nummer</b> | <b>Fråga</b>   | <b>JA/<br/>SANT</b> | <b>NEJ/<br/>FALSKT</b> |
|---------------|--|---------------------|------------------------|
| 1.00          | IgA-brist-diagnosen kan ställas från 2 års ålder   |                     | 1                      |
| 2.00          | Monospot är ett bra laboratorietest för att diagnostisera Infektiös mononukleos hos förskolebarn                 |                     | 1                      |
| 3.00          | Barn med Kawasakis sjukdom löper en ökad risk för koronarkärlsaneurysm   | 1                   |                        |
| 4.00          | Ketogen kost vid epilepsi-behandling innebär att man byter ut hälften av fett mot protein                        |                     | 1                      |
| 6.00          | Valproat är ett förstahandspreparat vid infanatil spasm  |                     | 1                      |
| 7.00          | Turner-flickor har bara en fungerande X-kromosom   | 1                   |                        |
| 8.00          | Synagis ges för att förhindra Rota-virus-infektioner   |                     | 1                      |
| 9.00          | För att kylbehandling efter perinatal asfyxi ska vara effektiv, måste den påbörjas inom 24 timmar efter födelsen |                     | 1                      |
| 10.00         | Kylbehandling efter perinatal asfyxi kan inte påbörjas på ett länssjukhus  |                     | 1                      |
| 11.00         | Influensavirus finns i tre former (A, B, C), där typ C ger den svåraste influensaformen                          |                     | 1                      |
| 12.00         | Till barn med chock som behöver syrgas inleder du med att ge fem liter syrgas på mask per minut                  |                     | 1                      |
| 13.00         | Cancer är den vanligaste dödsorsaken bland svenska barn  | 1                   |                        |
| 14.00         | Ronki hos barn med andningspåverkan och feber talar starkt för bakteriell genes                                  |                     | 1                      |
| 15.00         | Ductus arteriosus shuntar blod från aorta till vena cava superior  |                     | 1                      |
| 16.00         | Pulmonalisstenos ger högerkammarförstoring   | 1                   |                        |
| 17.00         | Glomerulonefrit går vanligtvis med lågt blodtryck  |                     | 1                      |
| 18.00         | Hos barn med sicke-cell-anemi kan favabönor utlösa en hemolytisk kris  |                     | 1                      |
| 19.00         | Alla barn med födelsevikt < 2500 g bör få järndroppar  | 1                   |                        |
| 20.00         | Pylorusstenos kan ge hypokloremisk alkalos   | 1                   |                        |
| 21.00         | Medulloblastom sitter oftast i någon av lillhjärnans hemisfärer  |                     | 1                      |
| 22.00         | Strålning av hjärntumörer hos små barn kan hämma barnets intellektuella utveckling                               | 1                   |                        |
| 23.00         | Småbarn som dricker stora mängder komjolk löper en ökad risk för järnbrist                                       | 1                   |                        |
| 24.00         | RS-virus sprids via droppsmitta  | 1                   |                        |
| 25.00         | Den vanligaste orsaken till chock hos barn i 5-10 års ålder är metabol sjukdom                                   |                     | 1                      |

**NAMN PÅ DIG SOM GÖR SKRIVNINGEN: .....**

| <b>Nummer</b> | <b>Fråga</b>   | <b>JA/<br/>SANT</b> | <b>NEJ/<br/>FALSKT</b> |
|---------------|--|---------------------|------------------------|
| 26.00         | Ett barn med typ 1 diabetes som inte får i sig någon mat ska heller inte ges insulin                                       |                     | 1                      |
| 27.00         | En majoritet av barn med infantil spasm lider av utvecklingsstörning   | 1                   |                        |
| 28.00         | Prematurfödda barn löper en ökad risk för anemi under första levnadsåret   | 1                   |                        |
| 29.00         | Nyföddhetscreeningen i Sverige omfattar idag 5 olika sjukdomar   |                     | 1                      |
| 30.00         | Metabola sjukdomar debuterar nästan alltid i nyföddhetsperioden  |                     | 1                      |
| 31.00         | Eldsmärken (Naevus flammeus) bleknar oftast bort före skolåldern   |                     | 1                      |
| 32.00         | Ett barn med fetma måste alltid gå ner i vikt för att behandlingen ska anses framgångsrik                                  |                     | 1                      |
| 33.00         | Den vanligaste tablettbehandlingen vid illamående hos barn med cancer är H2-blockerare                                     |                     | 1                      |
| 34.00         | Pylorusstenos förekommer framförallt hos pojkar  | 1                   |                        |
| 35.00         | Misstanke om barnmisshandel ska alltid föranleda anmälan till socialtjänsten   | 1                   |                        |
| 36.00         | Svamp i munnen hos i övrigt friskt spädbarn behandlar du företrädesvis med Acetylcystein                                   |                     | 1                      |
| 37.00         | Den bröstkörtelutveckling som kan ses hos tonårspojkar med fetma är reversibel.  |                     | 1                      |
| 38.00         | Gallstas leder till brist på bland annat vitamin A   | 1                   |                        |
| 39.00         | Ca ett av 5 barn drabbas av feberkramp någon gång i livet  |                     | 1                      |
| 40.00         | Inflammatorisk tarmsjukdom där inflammerade partier i colon varvas med friska partier rör sig sannolikt om Crohn's sjukdom | 1                   |                        |
| 41.00         | Kronisk ITP definieras som ITP längre än 6 veckor  |                     | 1                      |
| 42.00         | ASD (förmaksseptumdefekt) ger ofta symptom under barnets tre första levnads-månader  |                     | 1                      |
| 43.00         | Desmopressin vid nattenures kan ge hyponatremi   | 1                   |                        |
| 44.00         | Hepatit B ökar risken för hepatocellulär cancer  | 1                   |                        |
| 45.00         | IgA nefropati bör behandlas med kåvepenin  |                     | 1                      |
| 46.00         | Digitalis kan förhindra apnéer hos nyfödda   |                     | 1                      |
| 47.00         | Urin-albumin/kreatinin-kvot är ett sätt att kvantifiera proteinuri   | 1                   |                        |
| 48.00         | Lågt B12 ger lågt homocystein  |                     | 1                      |
| 49.00         | Gamma-GT är ett bra mått på leverns syntesförmåga  |                     | 1                      |
| 50.00         | Alports syndrom är associerat med dövhet   | 1                   |                        |

**NAMN PÅ DIG SOM GÖR SKRIVNINGEN: .....**

| <b>Nummer</b> | <b>Fråga</b>   | <b>JA/<br/>SANT</b> | <b>NEJ/<br/>FALSKT</b> |
|---------------|--|---------------------|------------------------|
| 51.00         | Bröstmärtor hos barn har oftast kardiell genes   |                     | 1                      |
| 52.00         | Hjärntumörer hos barn sitter vanligen i frontalloben   |                     | 1                      |
| 53.00         | Pareser vid Guillain-Barré är vanligtvis sidlika   | 1                   |                        |
| 54.00         | Dicykloverinklorid kan ges från 3 dagars ålder (mot spädbarnskolik)                                  |                     | 1                      |
| 55.00         | Svag radialispuls talar för coarctatio aortae  |                     | 1                      |
| 56.00         | En viktig komplikation vid Henoch-Schönlein purpura är appenicit                                     |                     | 1                      |
| 57.00         | Vid Addisons sjukdom bör kortisol-substitutionen fördubblas när barnet får 38 graders feber          | 1                   |                        |
| 58.00         | Det kan ofta ta mer än ett år innan mollusker läker ut   | 1                   |                        |
| 59.00         | En patient med PCO <sub>2</sub> på 10 och ett PH på 7.10 har troligen en respiratorisk acidosis      | 1                   |                        |
| 60.00         | Hos barn är risk för hjärnödem vid diabetes störst i tonåren   |                     | 1                      |
| 61.00         | Hemihypertrofi är kopplat till en ökad risk för nefroblastom   | 1                   |                        |
| 62.00         | IgA-brist ger oftast magbesvär   |                     | 1                      |
| 63.00         | Kreatinin är ett mer känsligt mått på njurfunktion än Cystatin C                                     |                     | 1                      |
| 64.00         | Barn med periodisk feber (PFAPA) har vanligtvis normalt CRP och LPK mellan feberepisoderna           | 1                   |                        |
| 65.00         | Vid akut metabol sjukdom bör energitillskott till barnet bestå av glukos                             | 1                   |                        |
| 66.00         | Hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS) går med låga trombocyter  | 1                   |                        |
| 67.00         | Akut tumörlys kan ge hyperkalemi och hjärtarytmi   | 1                   |                        |
| 68.00         | Skabb-kvalster är ungefär lika stora som en fästing  |                     | 1                      |
| 69.00         | Barn med Staphylococcal scalded skin syndrome bör sjukhusvårdas                                      | 1                   |                        |
| 70.00         | Vid nyföddhetsundersökningen får levern kännas 1-2 cm nedom höger arcus.                             | 1                   |                        |
| 71.00         | Vid hypoplastiskt vänsterkammersyndrom är tricuspidalis-klaffen underutvecklad                       |                     | 1                      |
| 72.00         | Tobramycin är ett lämpligt intravenöst antibiotika-val för eradikeringsbehandling vid cystisk fibros | 1                   |                        |
| 73.00         | Vid transposition av de stora kärlen är blodet i aorta syrefattigt                                   | 1                   |                        |

**NAMN PÅ DIG SOM GÖR SKRIVNINGEN: .....**

| <b>Nummer</b> | <b>Fråga</b>  | <b>JA/<br/>SANT</b> | <b>NEJ/<br/>FALSKT</b> |
|---------------|---|---------------------|------------------------|
| 74.00         | Blöjeksem behandlas med fördel med en grupp 1 glukokortikoid  | 1                   |                        |
| 75.00         | Vid akut herpesinfektion är tamiflu (oseltamivir) förstahandsmedel  |                     | 1                      |
| 76.00         | Gränsen för hypoglykemi hos nyfödda går vid mindre än 1.5 mmol/L  |                     | 1                      |
| 77.00         | En ettåring med andningsfrekvens 70/minut har en förhöjd andningsfrekvens                                     | 1                   |                        |
| 78.00         | Den vanligaste akuta glomerulonefriten är post-streptokock-glomerulonefriten                                  | 1                   |                        |
| 79.00         | Typ 1 diabetes är kopplat till en ökad risk för celiaki   | 1                   |                        |
| 80.00         | Ett barn med gastroenterit och 135 i Na har per definition en hyperton dehydrering                            |                     | 1                      |
| 81.00         | Ökat intrakraniellt tryck kan vid sidan av sänkt medvetande, och högt blodtryck också ge Tackykardi?          |                     | 1                      |
| 82.00         | Vid syndromet Catch-22 har man oftast en underutvecklad thymus  | 1                   |                        |
| 83.00         | Krampanfall kan leda till övergående hyperglykemi   | 1                   |                        |
| 84.00         | Pityriasis rosea kan utlösas av röntgen-kontrast  |                     | 1                      |
| 85.00         | Obehandlad fenylketonuri leder till kramper   | 1                   |                        |
| 86.00         | Kussmaul-andning vid diabetes beror på snabbt sjunkande kalium  |                     | 1                      |
| 87.00         | Utslagen vid Henoch-schönlein purpura sitter vanligtvis i ansiktet  |                     | 1                      |
| 88.00         | De flesta barn med perinatalt överförd Hepatit B utvecklar kronisk hepatit                                    | 1                   |                        |
| 89.00         | Feber kan ge proteinuri   | 1                   |                        |
| 90.00         | En saturationsskilnad om 2% (98% jämfört med 96%) i höger arm vs. höger fot är patologisk                     |                     | 1                      |
| 92.00         | Förstagångskrämp utan samtidig feber bör leda till EEG-undersökning   |                     | 1                      |
| 93.00         | Turners syndrom är en viktig orsak till akromegali  |                     | 1                      |
| 94.00         | Innan man sätter in Azathioprin vid inflammatorisk tarmsjukdom bör halten av Kolesterol acyl transferas mätas |                     | 1                      |
| 95.00         | Barn med hjärntumör som får strålning löper en ökad risk för endokrina långtidskomplikationer                 | 1                   |                        |
| 97.00         | Minimal change glomerulonefrit har god prognos  | 1                   |                        |
| 98.00         | Barn med njurcancer har ofta förhöjda katekolaminer i urinen  |                     | 1                      |
| 99.00         | Barn med obstruktivt sömnapné-syndrom lider ofta av dagtrötthet   | 1                   |                        |

**NAMN PÅ DIG SOM GÖR SKRIVNINGEN: .....**

| <b>Nummer</b> | <b>Fråga</b>  | <b>JA/<br/>SANT</b> | <b>NEJ/<br/>FALSKT</b> |
|---------------|---|---------------------|------------------------|
| 100.00        | Barn med svår leversjukdom är särskilt känsliga för G+ sepsis   |                     | 1                      |
| 101.00        | För att ställa diagnosen Rotavirus via laboratorium används vanligen en PCR-teknik eller en ELISA-teknik                                  | 1                   |                        |
| 102.00        | Vid Wiscott-Aldrich sjukdom har barnet ofta en ökad infektionsbenägenhet  | 1                   |                        |
| 103.00        | Normal andningsfrekvens hos ett friskt barn 1-2 år gammal är 60/minut   |                     | 1                      |
| 104.00        | Prognosen för överlevnad vid pre-B ALL/SR är cirka 95%  | 1                   |                        |
| 105.00        | SMA/glattmuskel-antikroppar ses ofta vid autoimmun hepatit  | 1                   |                        |
| 106.00        | De första månaderna är nyfödda barns vätskebehov kring 150 ml/kg och dygn.  | 1                   |                        |
| 107.00        | Ett barn med Hemofili A som har 10% av normal faktor-halt har oftast en mild form av Hemofili A   | 1                   |                        |
| 108.00        | Mörkhyade barn löper en ökad risk att drabbas av vitamin D-brist  | 1                   |                        |
| 109.00        | Ensidig okomplicerad otit hos 3-åring behandlar du med kåvepenin  |                     | 1                      |
| 110.00        | Den vanligaste debutåldern för Akut lymfatiskt leukemi är ca 2-4 år   | 1                   |                        |
| 111.00        | ALL utgör cirka 50% av alla leukemier hos barn  |                     | 1                      |
| 112.00        | När du sätter CPAP på ett barn är ofta 5 cm vatten ett vanligt tryck att börja med.   | 1                   |                        |
| 113.00        | Mycoplasma-infektion kan leda till hemolytisk anemi   | 1                   |                        |
| 114.00        | Hjärttumörer utgör drygt 30% av alla onkologiska diagnoser hos barn   | 1                   |                        |
| 115.00        | Nyfödda barns hjärta har en högerställd el-axel   | 1                   |                        |
| 116.00        | Psoriasis kan klia  | 1                   |                        |
| 117.00        | Barn med mindre än $80 \times 10^9/L$ trombocyter behöver vanligen en trombocyt-transfusion   |                     | 1                      |
| 118.00        | För barn födda i vecka 40 motsvarar 4100 g "stor för tiden"   |                     | 1                      |
| 119.00        | Anti-epileptika hos den gravida kvinnan ökar risken för hjärtmissbildningar hos avkomman  | 1                   |                        |
| 120.00        | Adenosin ges alltid vid behandling av förmaksflimmer  |                     | 1                      |
| 122.00        | En Kasai-operation innebär att man hos ett leversjukt barn kopplar samman en tarmslynga med leverhilus i syfte att förbättra galldränaget | 1                   |                        |

**NAMN PÅ DIG SOM GÖR SKRIVNINGEN: .....**

| <b>Nummer</b> | <b>Fråga</b>   | <b>JA/<br/>SANT</b> | <b>NEJ/<br/>FALSKT</b> |
|---------------|--|---------------------|------------------------|
| 123.00        | Serum-Osmolaliteten motsvarar ungefär den sammanlagda koncentrationen av [Na] + [urea] + [glukos]          |                     | 1                      |
| 124.00        | När ett barn med infantil spasm sätts in på synachten depot bör urinnängderna mätas dagligen               |                     | 1                      |
| 125.00        | Vid hydrocefalus framträder ofta barnets kapillärer mer tydligt  |                     | 1                      |
| 126.00        | Ett av fyra A-kriterier för kylbehandling av nyfödd är att BE är $\leq -16$ barnets första levnadstimme    | 1                   |                        |
| 127.00        | Barn under 2 års ålder har ofta atopiskt eksem på extensor-ytorna  | 1                   |                        |
| 128.00        | Retinoblastom debuterar ofta genom en nytillkommen skelning eller frånvaro av en röd ljusreflex i pupillen | 1                   |                        |
| 129.00        | Neuroblastom debuterar oftast med att man upptäcker att det drabbade barnet har en resistens i buken       | 1                   |                        |
| 130.00        | En ettåring som väger 10 kg har ett dagligt energibehov på ca 500 kcal                                     |                     | 1                      |
| 131.00        | Stjærtfluss beror oftast på streptokocker  | 1                   |                        |
| 132.00        | Fördelen med D-dimer är främst att ett normalt värde talar starkt emot tromboembolism                      | 1                   |                        |
| 133.00        | Fusobactericum Necrophorum kan ge allvarliga infektioner hos tonåringar?                                   | 1                   |                        |
| 134.00        | De flesta glomerulonefriter karakteriseras av förhöjda C3-nivåer   |                     | 1                      |
| 135.00        | Cushings sjukdom karakteriseras av en brist på binjurebarkshormoner  |                     | 1                      |
| 136.00        | Patienter med mycoplasma har ofta huvudvärk  | 1                   |                        |
| 137.00        | Sickle-cell-anemi kan ge svår smärta   | 1                   |                        |
| 138.00        | En majoritet av barn med juvenil idiopatisk artrit (JIA) har positiv anti-CCP/ reuma-faktor                |                     | 1                      |
| 139.00        | Betapred kan övergående ge förhöjt blodsocker  | 1                   |                        |
| 140.00        | Lung-röntgen av barn < 2 år med obstruktiv bronkit visar oftare perihilära infiltrat än basala infiltrat   | 1                   |                        |
| 141.00        | Entesit är en vanlig cytotostikabiverkan, vilken visar sig i form av ileocekal inflammation                |                     | 1                      |
| 142.00        | Vid hemofili B saknas faktor X   |                     | 1                      |
| 143.00        | Tremånaderskolik förekommer hos ca 1% av alla spädbarn   |                     | 1                      |
| 144.00        | Ett syskon med diabetes ökar risken för typ 1 diabetes mer än tio gånger                                   | 1                   |                        |
| 145.00        | Klinefeldters syndrom går medkromosom-uppsättning 45X0   |                     | 1                      |

**NAMN PÅ DIG SOM GÖR SKRIVNINGEN: .....**

| <b>Nummer</b> | <b>Fråga</b>  | <b>JA/<br/>SANT</b> | <b>NEJ/<br/>FALSKT</b> |
|---------------|---|---------------------|------------------------|
| 146.00        | Guttat psoriasis är kopplat till föregående E coli infektion  |                     | 1                      |
| 147.00        | Pertussis ger ofta en kraftig leukocytos  | 1                   |                        |
| 148.00        | Patienter med typ 1 diabetes som dricker sig berusade på alkohol löper en ökad risk för hypoglykemi   | 1                   |                        |
| 149.00        | Humant metapneumovirus är en vanlig orsak till diarré hos invandrabarn  |                     | 1                      |
| 150.00        | Öppetstående ductus arteriosus är vanligare hos prematurfödda än fullgångna barn  | 1                   |                        |
| 151.00        | Coarctatio aortae kan på sikt ge högt blodtryck   | 1                   |                        |
| 152.00        | Feber är en kontraindikation till MPR-vaccination   |                     | 1                      |
| 153.00        | Den kapillära återfyllnaden förlängs vid feber  |                     | 1                      |
| 154.00        | Vid järnbrist stiger S-ferritin   |                     | 1                      |
| 155.00        | Majoriteten av metabola sjukdomar ärvs autosomalt dominant  |                     | 1                      |
| 156.00        | Neutropen feberkan behandlas med valfri cefalosporin  |                     | 1                      |
| 157.00        | Ewing-sarkom har sämre 5-årsöverlevnad än leukemi   | 1                   |                        |
| 158.00        | Ett enkelt sätt att uppskatta en flickas target height är att ta genomsnittet av föräldrarnas längd och dra ifrån ca 6 cm                             | 1                   |                        |
| 159.00        | Etanol-intoxikation leder oftast till hypernatremi  |                     | 1                      |
| 160.00        | Karakteristiskt för SLE är att patienten oftast har höga vita och trombocyter   | 1                   |                        |
| 161.00        | Diagnosen fettlever ställs främst genom leverbiopsi   | 1                   |                        |
| 162.00        | En fem-åring med tre systoliska blodtryck om "100" har med stor sannolikhet hypertoni   |                     | 1                      |
| 163.00        | Transplacentala antikroppar skyddar det nyfödda barnet från luftvägsinfektioner under de första 12 levnadsmånaderna                                   |                     | 1                      |
| 164.00        | Hypoparathyroidism går med hyper-kalcemi  |                     | 1                      |
| 165.00        | Diabetes kan ge sekundär natt-enures  | 1                   |                        |
| 166.00        | De flesta barn med högt blodtryck har njurartärstenos   |                     | 1                      |
| 167.00        | Ett immunsupprimerat barn med cancer som inte tidigare haft vattkoppor, men som nu exponeras för vattkoppor måste ges immunglobuliner eller acyklovir | 1                   |                        |
| 168.00        | Vid status epilepticus är midazolam eller diazepam förstahandspreparat  | 1                   |                        |
| 169.00        | Cerebral pares kan även uppkomma efter förlossningen  | 1                   |                        |



**NAMN PÅ DIG SOM GÖR SKRIVNINGEN: .....**

| <b>Nummer</b> | <b>Fråga</b>   | <b>JA/<br/>SANT</b> | <b>NEJ/<br/>FALSKT</b> |
|---------------|--|---------------------|------------------------|
| 170.00        | Fetma hos barn beror oftast på ett påvisbart syndrom   |                     | 1                      |
| 171.00        | Vaccination mot svininfluensa är hos barn förknippat med en ökad risk för narkolepsi   | 1                   |                        |
| 172.00        | Bröstmjolk minskar risken för NEC  | 1                   |                        |
| 173.00        | Profylaktisk ljusbehandling vid S-bil under 85 har ingen effekt  | 1                   |                        |
| 174.00        | Reumatoid artrit hos den gravida kvinnan är associerat med totalt hjärtblock hos det nyfödda barnet  |                     | 1                      |
| 175.00        | En viktig biverkan vid Rotavirus-vaccin är invagination  | 1                   |                        |
| 176.00        | Folsyra-brist ger vanligtvis en mikrocytär anemi   |                     | 1                      |
| 177.00        | Social deprivering kan leda till dålig tillväxt  | 1                   |                        |
| 178.00        | Filaggrin-mutation ökar risken för atopiskt eksem  | 1                   |                        |
| 179.00        | Om båda individerna i ett föräldrapar är heterozygota för $\beta$ -thalassemia är risken för avkomman att få $\beta$ -thalassemia major 50 % |                     | 1                      |
| 180.00        | Ett barn med anemi drabbas lättare av synlig cyanos  |                     | 1                      |
| 181.00        | Hjärtsjukdom med ST-T syndrom kan vara en differentialdiagnos till status epilepticus  |                     | 1                      |
| 182.00        | Rotavirus har en inkubationstid på 4 till 6 timmar   |                     | 1                      |
| 183.00        | Vid epilepsi med Rolandic spikes är EEG-aktiviteten oftast sido-skiftande  | 1                   |                        |
| 184.00        | Barn < 2 års ålder med pneumoni och misstanke på haemophilus influenzae bör om de inte är allmänpåverkade ges amoxicillin                    | 1                   |                        |
| 185.00        | Högdosbehandling med Metotrexat (MTX) ska åtföljas av behandling med tetrahydro-folat  | 1                   |                        |
| 186.00        | Intubation med alltför grov tub kan utlösa så kallad "infantil spasm".   |                     | 1                      |
| 187.00        | Till ett barn med bakteriell pneumoni som tidigare reagerat med anafylaxi på PCV, så är dalacin ett alternativ                               | 1                   |                        |
| 188.00        | När insulin ges till patient med keto-acidos och typ 1 diabetes sjunker ofta S-Kalium  | 1                   |                        |
| 189.00        | Vissa läkemedel kan ge aplastisk anemi   | 1                   |                        |
| 190.00        | Nattliga svettningar är ett vanligt debutsymptom vid Wilms tumör   |                     | 1                      |
| 191.00        | Tietzes syndrom är en triad bestående av subvalvulär pulmonaliststenos, cyanos och överridande aorta   |                     | 1                      |

**NAMN PÅ DIG SOM GÖR SKRIVNINGEN: .....**

| <b>Nummer</b> | <b>Fråga</b>  | <b>JA/<br/>SANT</b> | <b>NEJ/<br/>FALSKT</b> |
|---------------|---|---------------------|------------------------|
| 192.00        | På ett fullgången nyfött 12 timmar gammalt barn med S-bil 150 och Dat -, kan kontroller av S-bilirubin avslutas |                     | 1                      |
| 193.00        | Rubella hos den gravida kvinnan ökar risken för hjärtmissbildningar   | 1                   |                        |
| 194.00        | Återkommande buksmärtor kan tyda på porfyri   | 1                   |                        |
| 195.00        | Hjärntumörer är den barncancerform som har längst delay mellan symtomdebut och diagnos                          | 1                   |                        |
| 196.00        | Mer än 80% av alla barn med cystisk fibros har svårt att bajsas som nyfödda (mekonium-ileus)                    |                     | 1                      |
| 197.00        | Nefrotiskt syndrom kan öka risken för trombos   | 1                   |                        |
| 198.00        | Vid ett akut skov av inflammatorisk tarmsjukdom hos barn är en rimlig prednisolondos ca 1-2 mg/kg och dag       | 1                   |                        |
| 199.00        | Asystoli hos ett barn bör omedelbart föranleda defibrillering   |                     | 1                      |
| 200.00        | Växtvärk hos barn visar sig ofta på morgnarna   |                     | 1                      |